

# Leidapharm Xylometazoline HCl 1 mg-ml Neusdruppels

Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

## Uiterlijk

Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: De neusdruppels bevatten een heldere, of vrijwel heldere, kleurloze oplossing.

## Samenstelling

De werkzame stof is xylometazolinehydrochloride. De neusdruppels bevatten per ml 1 mg xylometazolinehydrochloride. Als hulpstoffen zijn gebruikt: natriumchloride, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumedetaat, benzalkoniumchloride, methylhydroxypropylcellulose en gezuiverd water.

## Verpakkingsvorm

De neusdruppels zijn verkrijgbaar in een flaconverpakking van 10 ml.

## Hoe werkt Xylometazoline?

Xylometazoline behoort tot de groep van de zogenaamde imidazolinederivaten. Het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neuskeelholte. De werking treedt al binnen enkele minuten in en houdt meerdere uren aan.

## Inschrijving

De registratiehouder van dit geneesmiddel is

Leidapharm BV, Zernikedreef 20, 2333 CL Leiden.

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 18474 Xylometazoline HCl 1 mg/ml neusdruppels, neusdruppels

## Voor wie is Xylometazoline bestemd?

Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met een verstopte neus ten gevolge van verkoudheid of aandoeningen van de bijholten.

## Wanneer mag u Xylometazoline niet gebruiken?

Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn: overgevoeligheid voor xylometazolinehydrochloride of één van de andere bestanddelen uit de neusdruppels. Ook mag u dit middel niet gebruiken wanneer u bepaalde operaties via de neus hebt ondergaan.

### **Xylometazoline bij zwangerschap en borstvoeding...**

Voor zover bekend kan xylometazoline zonder gevaar overeenkomstig het voorschrift en niet langer dan 3-5 dagen zonder onderbreking (zie 'Waarschuwingen en voorzorgen') worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Wanneer u last heeft van een verhoogde bloeddruk of wanneer er aanwijzingen zijn voor een verminderde doorbloeding van de placenta moet u voorzichtig zijn met het gebruik van xylometazoline. Tijdens de periode van borstvoeding moet u eveneens voorzichtig zijn met het gebruik van xylometazoline.

### **Beïnvloedt Xylometazoline de rijvaardigheid en het reactievermogen?**

Hierop heeft xylometazoline voor zover bekend geen invloed.

### **Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen...**

Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Er zijn tot nu toe echter geen medicijnen bekend waarmee een wisselwerking op zou kunnen treden.

### **Waarschuwingen en voorzorgen...**

Als u last heeft van een verhoogde bloeddruk, nauwe kamerhoekglaucoom (bepaalde oogaandoening), hartritmestoornissen, suikerziekte of neiging tot duizeligheid bij het opstaan veroorzaakt door lage bloeddruk, moet u voorzichtig zijn met het gebruik van dit geneesmiddel. Kinderen, bejaarden en patiënten met een schildklier-aandoening kunnen soms zeer gevoelig zijn voor de neusdruppels. Gebruik de druppels niet langer dan 3-5 dagen zonder onderbreking. Irritatie of gewenning is dan mogelijk en u kunt opnieuw last krijgen van klachten zoals een verstopte neus en neusverkoudheid. De neusdruppels zijn niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

### **Aanwijzingen voor het gebruik...**

Houd bij het druppelen het hoofd achterover gebogen. Dit middel mag niet langer dan 3-5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden (zie 'waarschuwingen en voorzorgen').

### **Dosering**

In het algemeen geeft de onderstaande dosering voldoende resultaat: Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: Ten hoogste 3-4 maal per dag 1 tot 2 druppels in elk neusgat.

### **Verschijnselen en behandeling van overdosering...**

Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

### **Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen?**

Als u een dosis vergeten bent in te nemen dan slaat u deze gewoon over.

**Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Xylometazoline...**

Het gebruik van xylometazoline kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: voorbijgaand branderig gevoel in neus en keel, prikkeling of droogte van het neusslijmvlies, niezen, overmatige doorbloeding van het neusslijmvlies waardoor de neusverstopping juist weer kan toenemen en hartkloppingen. Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

**Hoe moet Xylometazoline bewaard worden?**

Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar de neusdruppels in de originele verpakking op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) beneden 25°C.

**Hoe lang kan Xylometazoline bewaard worden?**

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de neusdruppels gebruikt kunnen worden (maand en jaar). Wanneer de verpakking is aangebroken zijn de neusdruppels nog maximaal 1 maand houdbaar.

12/99

*Code: 6626*