



Collasense

Ongedenatureerd collageen type-II met vitamine C*

*Draagt bij tot de normale collageenvorming voor het normaal functioneren van kraakbeen

- Aanbevolen gebruik:** 1 x per dag 1 tot 2 capsule(s) buiten de maaltijd innemen
Bij voorkeur een half uur voor het ontbijt of een andere maaltijd
- Ingrediënten:** 50 mg l-ascorbinezuur (vitamine C), waarvan 40 mg vitamine C = 50% RI
40 mg UC-II met 10 mg ongedenatureerd collageen type II
- Hulpstoffen:** Microkristallijne cellulose, siliciumdioxide. Capsule: HPMC
- Interacties:** Niet bekend
- Opmerking:** Niet geschikt voor vegetariërs of mensen met een allergie/overgevoeligheid voor kip

Collasense	Art.Nr.	EAN	[NL] Z-Index	[B] CNK	[B] NUT/PL
40 mg UC-II - 30 capsules	29127	8715216291273	15808890		1149/35
40 mg UC-II - 60 capsules	29128	8715216291280	15681238	3078-649	1149/35

Het collageen in gewrichtskraakbeen bestaat voor 85-90% uit collageen type II. Het gepatenteerde productieproces zorgt er voor dat de specifieke ruimtelijke helix-structuur van het collageen type II intact blijft.

Collasense wordt gewonnen uit het borstbeen (sternum) van kippen. De veiligheid is bevestigd en aangetoond in studies bij mensen en dieren.