

Multi-Gyn[®] ACTIGEL



Multi-Gyn ActiGel

- behandelt en voorkomt BV
- herstelt de natuurlijke pH waarde
- gaat onaangename geur en afscheiding tegen
- optimaliseert de vaginale flora en de conditie van het slijmvlies
- werkt direct verzachtend bij jeuk, schraalheid en irritaties
- zowel voor uitwendig als inwendig gebruik

Lees voor gebruik de bijsluiter van Multi-Gyn ActiGel en bewaar de bijsluiter goed.

Distributeur voor Nederland:

SalesMark, Europark 20,
4904 SX, Oosterhout (NB) Email: info@salesmark.net

Producent:

BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Nederland.

A. Hoe werkt Multi-Gyn ActiGel ?

Multi-Gyn ActiGel is gebaseerd op het gepatenteerde 2QR-complex. Deze natuurlijke stof wordt gewonnen uit medicinale planten en bestaat uit bioactieve polysacchariden. Het heeft de unieke eigenschap om de hechting van schadelijke bacteriën te blokkeren en op deze wijze dergelijke bacteriën te neutraliseren. Dit natuurlijke blokkerende effect is volledig veilig en onschadelijk omdat het niet gebaseerd is op giftige stoffen of chemicaliën. Het heeft dan ook geen enkel negatief neveneffect.

Aanvullend op het belangrijke effect van het blokkeren van schadelijke bacteriën, ondersteunt Multi-Gyn ActiGel het natuurlijk herstelmechanisme van het weefsel en optimaliseert het de conditie van het slijmvlies.

Het zorgt direct voor een juiste vaginale zuurgraad (pH-waarde). De nuttige melkzuurbacteriën (Lactobacillen) worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en op deze wijze creëert Multi-Gyn ActiGel een optimale flora die ongemakken voorkomt.

B. Wijze van gebruik van Multi-Gyn ActiGel

U kunt Multi-Gyn ActiGel zo vaak gebruiken als u wilt, in feite elke keer als u last heeft van ongemakken zoals jeuk, afscheiding, geur, branderigheid of irritatie of deze wilt voorkomen.

Voor de behandeling van bacteriële vaginose (BV) met ongewenste afscheiding en/of geur, Multi-Gyn ActiGel minimaal 2 maal per dag, gedurende minimaal 5 dagen, in ruime hoeveelheid in de vagina aanbrengen.

Ter voorkoming van bacteriële vaginose (BV) of andere vaginale ongemakken, Multi-Gyn ActiGel om de drie dagen, voor het slapen gaan, uitwendig en/of inwendig aanbrengen.

Onbeschermde gemeenschap beïnvloedt de zuurgraad (pH waarde) van de vagina. Gebruik Multi-Gyn ActiGel binnen 8 uur na gemeenschap teneinde de optimale vaginale pH waarde te herstellen en ter voorkoming van de groei van ongewenste bacteriën en onaangename geur.

In geval van vaginale ongemakken zoals jeuk, branderigheid, irritaties, gevoeligheid, roodheid en schraalheid Multi-Gyn ActiGel minimaal 1 keer per dag, of zo vaak als het direct verzachtende effect gewenst is, in ruime hoeveelheid uitwendig en/of inwendig aanbrengen.

Let op ! : Na het aanbrengen kan een tintelend gevoel ontstaan.

Dit is normaal en het gevoel verdwijnt na enkele minuten.

Multi-Gyn ActiGel is volkomen veilig en kent geen beperkingen in gebruik. Het kan probleemloos naast medicatie gebruikt worden.

Bij aanhoudende klachten dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts of gynaecoloog.

Multi-Gyn ActiGel niet langer dan 30 dagen achter elkaar gebruiken binnen één behandelingsperiode.

C. Multi-Gyn ActiGel bevat alleen natuurlijke ingrediënten

Multi-Gyn ActiGel is een natuurlijk product, gebaseerd op het 2QR complex. Multi-Gyn ActiGel bevat geen geurstoffen en geen ingrediënten van dierlijke afkomst. Het bevat geen chemicaliën, geen conserveermiddelen of hormonen en is volledig veilig en onschadelijk. Het tast condooms niet aan.

Ingrediënten: Galactoarabinan Polyglucoronon Acid Crosspolymer*, Xanthan Gum, Glycerin, Caprylyl Glycol

*2QR : gepatenteerde bio-actieve polysaccharides

Allergieën voor de bestanddelen van Multi-Gyn ActiGel komen zeer zelden voor. Wanneer u een allergie heeft voor plantaardige stoffen adviseren wij u om een kleine hoeveelheid Multi-Gyn ActiGel op de binnenzijde van uw onderarm uit te proberen. Indien een jeukende rode plek verschijnt, bent u waarschijnlijk allergisch voor één van de bestanddelen van Multi-Gyn ActiGel. In dit geval adviseren wij u Multi-Gyn ActiGel niet te gebruiken.

D. Neveneffecten

Aangezien Multi-Gyn ActiGel een optimale zuurgraad heeft, en sperma basisch is, kan de aanwezigheid van Multi-Gyn ActiGel in de vagina de activiteit van het sperma beïnvloeden. Dus indien u zwanger wilt worden moet u ActiGel niet gebruiken in de uren direct voor en na gemeenschap. Er zijn geen andere neveneffecten bekend.

E. Interactie met medicijnen

Multi-Gyn ActiGel kan probleemloos naast medicatie gebruikt worden.


F. Zwangerschap en lactatie

Multi-Gyn ActiGel kan zonder bezwaar tijdens zwangerschap en periode van borstvoeding gebruikt worden.


G. Toepassing

Voor ongemakken van de **uitwendige schaamstreek** (de vulva) dient u Multi-Gyn ActiGel royaal met de vinger op te brengen (was uw handen voor gebruik). Zie plaatjes hieronder.


Uitwendige toepassing




1. Draai de dop van de tube. Voordat u ActiGel de eerste keer kunt gaan gebruiken moet u met de achterzijde van de dop een gaatje prikken in de verzegelde opening van de tube.



2. Neem de tube in één hand en houd de wijsvinger van uw andere hand dicht bij de tube, zoals het plaatje laat zien. Knijp zachtjes in de tube. Blijf knijpen tot u een ruime hoeveelheid op uw wijsvinger heeft, zoals het plaatje laat zien.



3. De hoeveelheid op uw wijsvinger is vergelijkbaar met de grootte van uw vingertop (ongeveer 2 ml).



4. Blijf de gel aan op de uitwendige schaamstreek.

