	LAXEERDRANK LACTULOSE APOTEX 667 mg/ml	Module 1.3.1.3
	RVG 32710	PIL
	Version 2017-03	Page 1 of 5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

LAXEERDRANK LACTULOSE APOTEX 667 mg/ml, stroop 667 mg/ml lactulose

Lactulose

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na een paar dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Laxeerdrank lactulose Apotex en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Laxeerdrank lactulose Apotex en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Laxeerdrank lactulose Apotex bevat een laxeermiddel, genaamd lactulose. Het zorgt voor een zachtere en beter uit te scheiden ontlasting door water in de darm aan te trekken. Het wordt niet in uw lichaam opgenomen.

Dit geneesmiddel is bestemd voor mensen met een moeilijke stoelgang (obstipatie).

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als u:

- overgevoelig (allergisch) bent voor lactulose of één van de andere bestanddelen van Laxeerdrank lactulose Apotex (zie rubriek 6).
- lijdt aan een ernstige genetische afwijking waardoor u geen galactose verteert (galactosemie).
- lijdt aan een darmafsluiting (anders dan normale verstopping).
- bij plotseling optredende buikpijn.


Als u dit niet zeker weet, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Laxeerdrank lactulose Apotex gaat gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken, in het bijzonder als u melksuiker (lactose) niet kunt verteren.

U mag Laxeerdrank lactulose Apotex niet gebruiken als u:

- bepaalde suikers niet verdraagt (galactose- of fructose intolerantie).
- Lapp-lactase deficiëntie heeft.
- glucose-galactose slecht opneemt.
- suikerziekte (diabetes) heeft. De gebruikelijke dosering bij verstopping vormt geen bezwaar voor

	LAXEERDRANK LACTULOSE APOTEX 667 mg/ml	Module 1.3.1.3
	RVG 32710	PIL
	Version 2017-03	Page 2 of 5

suikerpatiënten.
- een bepaald gastro-cardiaal syndroom heeft (Roemheld syndroom).

Langdurig gebruik of misbruik kan leiden tot diarree en verstoring van de vochtbalans. Bij overdosering dient het gebruik onmiddellijk te worden onderbroken waarna binnen 24 - 48 uur de diarree vanzelf ophoudt.

Aanbevolen wordt om tijdens de behandeling met een laxeermiddel veel te drinken (per dag 1,5-2 liter; overeenkomend met 6-8 glazen).

Als er na een paar dagen gebruik van Laxeerdrank lactulose Apotex geen verbetering van uw toestand optreedt of als uw symptomen verergeren, neem dan contact op met uw arts. Gebruik Laxeerdrank lactulose Apotex niet meer dan 2 weken zonder medisch advies.

Kinderen

Laxeerdrank lactulose Apotex mag in principe niet aan baby's en kleinere kinderen gegeven worden omdat het de normale reflexen voor ontlasting kan verstoren.

In speciale omstandigheden kan uw arts Laxeerdrank lactulose Apotex aan een kind, peuter of baby voorschrijven. Uw arts zal de behandeling dan goed in de gaten houden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Laxeerdrank lactulose Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Geneesmiddelen waarvan bekend is dat zij de werking van lactulose kunnen beïnvloeden, of waarvan lactulose de werking kan beïnvloeden zijn bepaalde middelen die gegeven worden bij langdurige darmontstekingen (zoals middelen die 5-aminosalicylzuur bevatten).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Laxeerdrank lactulose Apotex kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot eten en drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Dit middel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en in de periode van borstvoeding.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lactulose heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem uw dosering altijd op een vast tijdstip van de dag in, bij voorkeur bij het ontbijt. Laxeerdrank lactulose Apotex kunt u onverdund of verdund met wat water of vruchtensap innemen. Meet de juiste hoeveelheid af met de bijgeleverde doseercup.

	LAXEERDRANK LACTULOSE APOTEX 667 mg/ml	Module 1.3.1.3
	RVG 32710	PIL
	Version 2017-03	Page 3 of 5

Dosering

	Dagelijkse startdosis (in ml)	Dagelijkse onderhoudsdosis (in ml)
Volwassenen en adolescenten	15 – 45 ml	15 – 30 ml
Kinderen (7 – 14 jaar)	15 ml	10 – 15 ml
Kinderen (1 – 6 jaar)	5 – 10 ml	5 – 10 ml
Baby's (zuigelingen)	tot 5 ml	tot 5 ml

Afhankelijk van uw reactie op dit middel kan na een aantal dagen van de startdosis worden overgegaan op de onderhoudsdosis. Er kunnen enkele dagen (2-3 dagen) nodig zijn voordat de behandeling effect heeft.

Gebruik bij kinderen

Gebruik van laxemiddelen bij kinderen, peuters en baby's dient bij uitzondering te gebeuren en onder medische supervisie omdat het de normale reflexen voor ontlasting kan verstoren. Geef Laxeerdrank lactulose Apotex niet aan kinderen onder de 14 jaar voordat u uw arts geraadpleegd heeft voor het voorschrijven en nauwkeurige supervisie.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

In geval van overdosering kunt u last krijgen van diarree en buikpijn. Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer u teveel Laxeerdrank lactulose Apotex heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis vergeten bent in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer de tijd tot aan de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te doen. U kunt dan beter een dosering overslaan.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u wilt stoppen met de behandeling of deze wil veranderen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- winderigheid (flatulentie), vooral tijdens de eerste dagen van de behandeling; dit verdwijnt gewoonlijk weer na een paar dagen;
- misselijkheid;
- overgeven;
- buikpijn en diarree, wanneer u een hogere dosering heeft ingenomen dan is aanbevolen.

	LAXEERDRANK LACTULOSE APOTEX 667 mg/ml	Module 1.3.1.3
	RVG 32710	PIL
	Version 2017-03	Page 4 of 5

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden op de website van Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaar Laxeerdrank lactulose Apotex in de originele verpakking beneden 25°C en buiten invloed van licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste gebruiksdatum. Die is te vinden op de verpakking na de afkorting Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste gebruiksdatum.

Na opening van de flacon nog 12 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof is lactulose. De stroop bevat per ml 667 mg lactulose. Behalve water zitten er geen andere stoffen in dit middel. Dit middel kan kleine hoeveelheden andere suikers bevatten, zoals galactose, lactose, epilactose en tagatose.

Hoe ziet Laxeerdrank lactulose Apotex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Laxeerdrank lactulose Apotex is een (bijna) heldere en kleurloze tot bruingele dikke vloeistof.

Laxeerdrank lactulose Apotex is verkrijgbaar in kunststof flacons van 100, 150, 200, 300, 500 en 1000 ml. De verpakking bevat tevens een doseercup.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Apotex Europe BV
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland

Fabrikant:


Apotex Nederland BV
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederland

Voor informatie:

Apotex Nederland BV
Postbus 408
2300 AK Leiden
Nederland
Tel.nr.: 071 524 3100

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 32710 Laxeerdrank lactulose Apotex 667 mg/ml, stroop

	LAXEERDRANK LACTULOSE APOTEX 667 mg/ml	Module 1.3.1.3
	RVG 32710	PIL
	Version 2017-03	Page 5 of 5

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in april 2017