



Patiëntenbijsluiter DARO Paracetamol Vloeibaar

Lees deze bijsluiter steeds voor het gebruik van dit geneesmiddel. Ook indien u reeds eerder DARO Paracetamol Vloeibaar hebt gebruikt. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd indien u een volgende verpakking krijgt.

› Samenstelling

Daro Paracetamol Vloeibaar bevat 24 mg paracetamol per ml en in de maatbeker 120 mg per 5 ml. Dit suikervrije, tandveilige product is gezoet met 1,5 gram maltitol siroop per 5 ml. Gebleken is dat maltitol, als suikervervanger, tandveiliger is dan sorbitol. Maltitol siroop wordt in de darm omgezet in o.a. glucose en sorbitol. Daarnaast bevat het product polyethyleenglycol 400, glycerol, natriummethylhydroxybenzoaat, natriumpropylhydroxybenzoaat, natriumcyclamaat, natriumcitraat, frambozenaroma en water. Daro Paracetamol Vloeibaar bevat geen kleurstoffen.

› Farmaceutische vorm en inhoud

Daro Paracetamol Vloeibaar is een suikervrije stroop, verkrijgbaar in een fles à 100 ml met kinderveilige sluiting, verpakt in een kartonnen doosje en voorzien van een bijsluiter en een maatbeker.

› Geneesmiddelen-groep

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend

› Registratiehouder

Remark Pharma
Meppel

NL: 0900-111 22 23 (€ 0.25 p.m.)

In het register ingeschreven onder RVG 06566

› Toepassing van het geneesmiddel

Bij hoofdpijn, kiespijn, koorts en pijn bij griep en verkoudheid, koorts en pijn na inenting.

› Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt
Daro Paracetamol Vloeibaar mag niet gebruikt worden bij overgevoeligheid voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen.

› Nodige voorzorgen bij gebruik

Bij zwangerschap

Gebruik in de zwangerschap dient uitsluitend op advies van de arts plaats te vinden.

Vrouwen die borstvoeding geven

Gebruik tijdens de borstvoeding dient uitsluitend op advies van de arts plaats te vinden
Ouderen

Niet van toepassing

Diabetespatiënten

10 ml Daro Paracetamol Vloeibaar suikervrij bevat 69 kilo Joules (16 kCal.), overeenkomend met 4 gram koolhydraten.

› Rijvaardigheid of vermogen machines te bedienen

Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen.

› Waarschuwingen verband houdend met de in het product aanwezige hulpstoffen

Zie 'Nodige voorzorgen bij gebruik; diabetespatiënten'.

› Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden

Daro Paracetamol Vloeibaar kan soms met bepaalde geneesmiddelen wisselwerkingen vertonen (dit betekent dat ze elkaars (bij)werking(en) kunnen beïnvloeden).

Als u of uw kind nog andere geneesmiddelen gebruikt is het raadzaam vooraf bij uw apotheek of arts te vragen of de geneesmiddelen tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van Daro Paracetamol Vloeibaar en chlooramfenicol (antibioticum), zidovudine (middel tegen bepaalde virussen), slaap- en kalmeringsmiddelen en alcohol.

› Speciale waarschuwingen

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Voorzichtigheid is geboden bij lever- en nierfunctiestoornissen. Voorzichtigheid is geboden bij chronisch alcoholisme, de dagdosering dient dan de 2 gram niet te overschrijden.

Indien de klachten langer dan 14 dagen aanhouden, of regelmatig terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

› Aanwijzingen voor het gebruik

Leeftijd	Dosis (milliliters)	Aantal doses per dag
Baby's jonger dan 3 mnd	Na doktersadvies	Na doktersadvies
0 - 3 jaar	2,5 ml - 5 ml	4-6x
3 - 4 jaar	5 - 7,5 ml	4-6x
4 - 6 jaar	7,5 ml	4-6x
6 - 9 jaar	10 ml	4-6x
9 - 12 jaar	15 ml	4-6x
12 - 15 jaar	20 ml	4-6x

De lagere dosisfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie.

› Dosering voor volwassenen

Daro Paracetamol Vloeibaar kan desgewenst door volwassenen worden gebruikt. De dosering voor volwassenen bedraagt per keer 20 tot 40 ml, maximaal 6 keer per dag.

› Wijze van gebruik

- De fles wordt geopend door de kinderveilige dop in te drukken en tegelijkertijd open te draaien. Bij het sluiten van de fles dient de dop (zonder in te drukken) voldoende te worden aangedraaid om kinderveilig gesloten te zijn.
- Bij eerste maal openen verbreekt de dopring. Gebruik het product niet indien de dopring reeds verbroken was.
- De hierboven aangegeven doseringen dienen niet te worden overschreden.
- Bij de verpakking is een maatbeker met deelstrepen per 2,5 ml gevoegd. Een volle maatbeker komt overeen met 30 ml.
- Gebruik voor een juiste dosering de ingesloten maatbeker. De maatbeker dient na gebruik schoongespoeld te worden.

› Hoe vaak in te nemen?

- Wacht altijd tenminste 4 uur voor de volgende dosis.
- Afhankelijk van het weer opkomen van de symptomen (koorts en pijn) is herhaalde toediening toegestaan.

› Duur van de behandeling

Niet langer dan twee weken (zie rubriek 'Speciale waarschuwingen'). Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden.

› Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven?

Raadpleeg uw arts.

Het in éénmaal innemen van enkele malen de dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Toch dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.

› Wat te doen als een dosis vergeten is?

Het vergeten van een dosis heeft geen nadelige gevolgen. Indien nodig kan men doorgaan met de aangegeven dosering. Neem geen dubbele dosis.

› Wat gebeurt er als er plotseling gestopt wordt met het innemen van het geneesmiddel?

Het gebruik van Daro Paracetamol Vloeibaar kan zonder gevolgen plotseling gestopt worden.

› Bijwerkingen

Als de aangegeven dosering niet wordt overschreden treden weinig bijwerkingen op. Paracetamol kan overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en galbulten veroorzaken. De suikervervanger in Daro Paracetamol Vloeibaar kan diarree veroorzaken. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bij-werking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

› Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C), buiten het bereik van kinderen. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking en het etiket vermeld voorafgegaan door 'Niet te gebruiken na:'.

December 2001