

## NANNYCARE® PRODUCTEN / PRODUITS NANNYCARE®

**NANNYcare zuigelingenmelk** is een volledige zuigelingenvoeding op basis van geitenmelk. Dit product is specifiek geschikt om te worden gebruikt als voeding voor zuigelingen vanaf de geboorte, wanneer zij geen borstvoeding krijgen (of in combinatie met borstvoeding). Le lait pour nourrissons NANNYcare est une préparation pour nourrissons à base de lait de chèvre. Ce produit est spécifiquement indiqué comme alimentation des nourrissons dès la naissance, lorsqu'ils ne sont pas allaités au sein (ou en combinaison avec l'allaitement maternel).

## INGREDIËNTEN / INGRÉDIENTS

Gepasteuriseerde vaste **geitenmelk**bestanddelen (43%), lactose (uit melk), plantaardige oliën (zonnebloem [hoog oléine], koolzaad en zonnebloem), mineralen, vitamine, zuurteregelaar: citroenzuur, cholinechloride, antioxidant: zonnebloemlecithine, L-tryptofaan, L-isoleucine, taurine, L-carnitine, antioxidant: tocoferolrijk extract. **Vitamines:** ascorbinezuur, dl-*α*-tocoyeracetaat, nicotinamide, retinylacetaat, cholecalciferol, calcium-d-pantothenaat, fytomenadion, cyanocabalamin, thiaminehydrochloride, riboflavin, pyridoxinehydrochloride, foliumzuur, biotine. **Mineralen:** calciumhydroxide, natriumcitraat, kaliumchloride, ijzersulfaat, calciumcitraat, zinksulfaat, kopfersulfaat, mangansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet. Fractions de lait de chèvre en poudre et pasteurisées (43%), lactose (de lait), huiles végétales (tournesol [riche en oléine], colza et tournesol), minéraux, vitamines, correcteur d'acidité: acide citrique, chlorure de choline, antioxydant: léchitine de tournesol, L-tryptophane, L-isoleucine, taurine, L-carnitine, antioxydant: extrait riche en tocophérols. **Vitamines:** acide ascorbique, acétate de dl-*α*-tocophéryle, nicotinamide, acétate de rétinyle, cholecalciférol, d-pantothénate de calcium, phytoménadione, cyanocabalamin, chlorhydrate de thiamine, riboflavin, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, biotine. **Minéraux:** hydroxyde de calcium, citrate de sodium, chlorure de potassium, sulfate de fer, citrate de calcium, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium.

## BELANGRIJK / IMPORTANT

Borstvoeding wordt in het algemeen beschouwd als de beste voeding voor zuigelingen. Het wordt aanbevolen NANNYcare zuigelingenmelk alleen te gebruiken op advies van onafhankelijke deskundigen op het gebied van geneeskunde, voeding of farmaceutische wetenschap of van personen die beroepsmatig verantwoordelijk zijn voor de zorg voor moeder en kind. L'allaitement est généralement considéré comme la meilleure alimentation pour nourrissons. Il est recommandé d'utiliser le lait pour nourrissons NANNYcare uniquement sur le conseil d'experts indépendants en médecine, nutrition ou sciences pharmaceutiques, ou de professionnels responsables du soin de la mère et de l'enfant.

**GARANTIE:** dit product behoort u in perfecte staat te bereiken. Is dat niet het geval, neem dan contact met ons op. Ce produit doit vous parvenir en parfait état. Veuillez nous contacter dans le cas contraire.

VITALS VOEDINGSSUPPLEMENTEN BV

0031-(0)75-6476050, www.nannycaregeitenmelk.nl

Antwoordnummer 894, 1500 VB Zaandam, Pays-Bas.

info@nannycaregeitenmelk.nl

Geproduceerd in Nieuw-Zeeland  
Produit en Nouvelle-Zélande

EEA05 400g e



# NANNY care®



# 1

DÈS LA NAISSANCE

Vanaf de geboorte  
**Zuigelingenmelk**

VAN NIEUW-ZEELANDSE GEITEN

LAIT POUR NOURRISONS DE CHÈVRES NÉO-ZÉLANDAISES

## BEREIDINGSWIJZE / MODE DE PRÉPARATION

Volg de instructies voor bereiding en bewaring nauwkeurig op. Aan onjuiste bereiding en bewaring van het product zijn risico's voor de gezondheid verbonden. Suivez scrupuleusement les instructions de préparation et de conservation. Une mauvaise préparation et conservation du produit comporte des risques pour la santé.

- 1 Was uw handen en steriliseer flessen en spenen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Lavez-vous les mains et stérilisez les biberons et les tétines conformément aux instructions du fabricant.
- 2 Kook vers, koud water. Gebruik geen water dat gefilterd is of op een andere manier onthard en ook geen water dat herhaaldelijk gekookt heeft. Laat het niet langer dan 30 minuten afkoelen. Giet de benodigde hoeveelheid water (zie tabel) in een gesteriliseerde zuigfles.
- 3 Vul de bijgevoegde maatschep losjes met poeder en strijk af. Voeg altijd 1 afgestreeken maatschep (4,3 gram) poeder toe aan elke 30 ml water in de fles. Prenez la mesurette incluse dans la boîte et remplissez-la de poudre à ras bord. Ajoutez toujours une mesurette de poudre rase (4,3 grammes) pour chaque 30 ml d'eau dans le biberon.
- 4 Voeg het benodigde aantal maatscheppen toe aan het gekookte en afgekoelde water. Ajoutez le nombre requis de mesurettes à l'eau bouillie et refroidie.
- 5 Doe de gesteriliseerde speen en dop op de fles en schud tot het poeder volledig is opgelost. Fixez la tétine et le capuchon stérilisés sur le biberon et agitez-le jusqu'à dissolution complète de la poudre.
- 6 Laat de fles zo nodig verder afkoelen onder koud stromend water. Controleer de temperatuur van de voeding (handwarm). Geef de voeding onmiddellijk na de bereiding. Le cas échéant, laissez refroidir davantage le biberon sous un filet d'eau froide du robinet. Vérifiez la température de l'alimentation (tiède). Donnez le biberon immédiatement après sa préparation.

## VOEDINGSTABEL 0-12 MAANDEN / TABLEAU ALIMENTAIRE DE 0-12 MOIS

Leeftijd (maand) Age (mois)	Gem gewicht (kg) Poids moyen (kg)	Voedingen per dag / Nombre de biberons par jour	Afgekoeld gekookt water per voeding Eau par biberon (ml)	Afgestreeken schepjes poeder / Nombre de mesurettes remplies à ras
0-1	< 4	6	90	3
1-2	4-5	5	150	5
3-5	6-7	5	210	7
6*-12	> 8	4	240	8

\*Vanaf 6 maanden als onderdeel van een gevareerde voeding. Een maatschep van 4,3 gram is bijgesloten. Deze voedingstabell geeft slechts een richtlijn. Mogelijk heeft uw kindje meer of minder nodig dan in de tabel staat aangegeven. \* À partir de 6 mois dans le cadre d'un régime alimentaire varié. Une mesurette de 4,3 grammes est incluse dans la boîte. Ce tableau alimentaire n'est qu'une orientation. Les besoins de votre enfant peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux indiqués dans le tableau.

## VOEDINGSWAARDE / VALEUR NUTRITIVE

Voedingswaarde bij bereiding volgens de aanwijzingen / Valeur nutritive en cas de préparation conformément aux instructions

Per 100 ml bereide voeding / Par 100 ml d'alimentation préparée

VITAMINEN / VITAMINES	
Vitamine A	µg RE 70
Vitamine D3	µg 1,0
Vitamine E	mg α-TE 1,5
Vitamine K1	µg 6,7
Vitamine C	mg 10
Thiamine (B1)	µg 62
Riboflavine (B2)	µg 120
Niacine (B3)	µg 680
Vitamine B6	µg 36
Foliumzuur / Acide folique	µg 8,7
Vitamine B12	µg 0,18
Biotine	µg 2,3
Pantotheenzuur / Acide pantothénique	µg 350

## MINERALEN / MINÉRAUX

Kalium / Potassium	mg 74	Fluoride / Fluorure	µg 6,5
Chloride / Chlorure	mg 68	Selenium / Sélénium	µg 1,2
Calcium	mg 65	Jodium / Iode	µg 8,1
Fosfor / Phosphore	mg 43		
Magnesium / Magnésium	mg 5,9		

## OVERIG / AUTRES

IJzer / Fer	mg 0,71	Choline	mg 13
Zink / Zinc	mg 0,49	Taurine	mg 4,6
Koper / Cuivre	µg 45	Carnitine	mg 0,90
Mangaan / Manganèse	µg 8,4	Inositol	mg 3,9

## BELANGRIJK AANWIJZINGEN / CONSIGNES IMPORTANTES

Bewaar om hygiënische redenen geen reeds bereide voeding. Maak elke keer een verse voeding klaar en gooij restjes voeding altijd uiterlijk na 2 uur weg. Warm de voeding niet op in de magnetron om ongelijkmatige verwarming te voorkomen. Voeg geen extra scheppen poeder of andere ingrediënten toe aan de fles. Bewaar (on)geopende blikken op een koele, droge plaats (niet in de koelkast). Blik steeds goed afsluiten. Gebruik de inhoud binnen 4 weken na de eerste opening. Pour des raisons hygiéniques, ne conservez jamais des biberons préparés à l'avance. Maak chaque fois une nouvelle préparation. Jetez les restes de lait dans les 2 heures. Ne réchauffez pas le lait dans le micro-ondes. Ne ajoutez pas de mesurettes de poudre supplémentaires ni d'autres ingrédients au biberon. Conservez des boîtes ouvertes ou non dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur). Veillez à toujours bien fermer la boîte. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après la première ouverture.