



VITALS

VITAMIN B12 2000 MCG

**Methylcobalamin/
Adenosylcobalamin**

100
LUTSCH-
TAB.

INGREDIËNTEN / ZUTATEN:

Zoetstoffen (mannitol en xylitol, uit plantaardige bron), versterkingsmiddel (hydroxypropylcellulose), antiklontermiddel (magnesiumzouten van vetzuren), kersenaroma, zuurteregelaar (citroenzuur), methylcobalamine, adenosylcobalamine.

Süßungsmittel (Mannitol und Xylitol, aus pflanzlichen Quellen), Festigungsmittel (Hydroxypropylcellulose), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Kirscharoma, Säureregulator (Zitronensäure), Methylcobalamin, Adenosylcobalamin.

GEBRUIK / VERZEHREMPFEHLUNG:

1 zuigtablet per dag onder de tong laten smelten. Houd u aan de aanbevolen dosering. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.

1 Lutschtablette pro Tag unter der Zunge zergehen lassen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.



VITALS

VITAMINE B12 2000 MCG

**methylcobalamine/
adenosylcobalamine**

100
ZUIGTAB.

SAMENSTELLING / ZUSAMMENSETZUNG:

Per zuigtablet / pro Lutschtablette:		RI/NRV*
Vitamine B12/Vitamin B12	2000 µg	80000%
Waarvan/Davon:		
methylcobalamine/ Methylcobalamin	1000 µg	40000%
adenosylcobalamine/ Adenosylcobalamin (dibencozide/Dibencozid)	1000 µg	40000%

* RI = Referentie-inname/NRV = Nutrient Reference Value, Nährstoffbezugswert

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren.

Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Ein Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Trocken, geschlossen und bei Zimmertemperatur lagern.