State-of-the-art anti-septic bij Bacteriële Vaginose

EVAGYNAL®

EVAGYNAL®

Dosering en wijze van toedienen

Doorgaans is **éénmaal toedienen** voldoende.
De behandeling kan op advies van een arts eventueel na 4 dagen worden herhaald.

Indien u na de behandeling, de vaginale flora snel wenst te laten herstellen met Normaflor® vaginaal tabletten, start deze dan **1 week na de laatste applicatie met EVAGYNAL®**

Werking

EVAGYNAL helpt de normale fysiologische gesteldheid van de vagina te herstellen gedurende de behandeling van vaginale aandoeningen of na een medische ingreep. Het product bevat polyhexanide (PHMB), een kationisch surfactant die zeer goed wordt verdragen door alle slijmvliezen. Polyhexanide is een polymeer welke is opgebouwd uit monomeren die een biguanidegroep bevatten. Door het gebruik van EVAGYNAL wordt het herstel van de normale lichaamsfuncties bevorderd, ook gedurende traumatische behandelingen zoals farmacologische of medische.

Toepassing

Hulpstof bij de behandeling van ontstekingen van de vulva, vagina en de baarmoederhals, ongeacht aard en oorzaak. Na medische ingrepen (diathermische coagulatie, lasertherapie, cryotherapie) in combinatie met wondbehandeling.

EVAGYNAL®
Vaginale oplossing

EVAGYNAL®

Contra-indicaties

Vastgestelde overgevoeligheid voor de bestanddelen.
Tijdens de zwangerschap mag het product alleen worden gebruikt indien strikt noodzakelijk en onder medische begeleiding.

Bijwerkingen

In sommige gevallen kan een overgevoeligheid (branderigheid of irritatie) optreden, wat verder geen gevolgen heeft en waarvoor de behandeling niet hoeft te worden aangepast; patiënten dienen echter melding te maken bij arts en apotheker van elke ongewenste bijwerking die vermoedelijk wordt veroorzaakt door het product.

Incompatibiliteit

Geen

Waarschuwingen

(Met name langdurig) gebruik van producten die plaatselijk worden toegepast kan leiden tot overgevoeligheid. In dat geval moet u de behandeling staken en contact opnemen met uw arts voor een passende behandeling. Het product mag alleen vaginaal worden toegediend. Er zijn geen schadelijke effecten gerapporteerd bij overdosering, mits het product onder normale condities wordt gebruikt.

Samenstelling

Polyhexamethyleen biguanide hydrochloride (PHMB)	0,10
Natriumedetaat	0,10
Glycerol	2,00
Hydroxyethylcellulose	0,60
Kaliumchloride	0,15
Melkzuur	0,20
Gezuiverd water	qb tot 100 ml

Verpakking

Verpakking 1 flacon à 100 ml vaginale oplossing + applicator
Publieksprijs: € 13,00
Verkoop uitsluitend via apotheek

Z-Indexnummer: 15792005

Postbus 211, 6600 AE Wijchen, Nederland
tel: +31 (0)24 645 54 11, info@memidis.nl, www.memidis.nl

CE Medisch Hulpmiddel

MEMIDIS Pharma b.v.